

重视白塞病的血管损害

吴振彪

第四军医大学附属西京医院 临床免疫科

白塞病的病理基础为血管炎,可累及所有类型及大小的血管,包括动脉及静脉。深静脉血栓形成及动脉瘤形成是BD血管病变中最特征性的病变,要引起足够重视。有一项研究观察796名BD患者中,发现12.8%(102名)患者存在血管损害,男女性别比为3.86:1。血管损害的平均发病年龄为 29.5 ± 11.3 岁。其中有28名患者(占27.5%)的首发表现为血管损害。其中72名(70.6%)存在静脉损害,56名(54.9%)存在动脉损害,26名(25.5%)同时存在静脉和动脉损害。

所以BD患者血管受累最特征性的改变为血栓性静脉炎,尤其是下肢深静脉血栓。动脉损害中最主要的类型为动脉扩张甚至形成动脉瘤。血管病变累及眼、颅内、主动脉及心脏血管时则可对患者造成极大影响,也易被误诊及漏诊,应引起广大医师的重视。一旦发现血管病变,通常需要积极治疗。一般需要中到大量激素联合免疫抑制剂,免疫抑制剂可酌情选用环磷酰胺,硫唑嘌呤或环孢素A。部分患者难治或治疗效果不佳,可选用肿瘤坏死因子拮抗剂、 α 干扰素等治疗。